

Вопросы страдающим ревматоидным артритом

Укажите пожалуйста Ваш рост _____ см и вес(массу тела)_____ кг.

В своих ответах подчеркните нужное!

I Какова длительность Вашего заболевания?

1. Менее 6 мес.
2. Менее года.
3. Более года, но менее двух лет.
4. Более двух лет
5. Более пяти лет

II Через какой промежуток времени от начала заболевания Вам был назначен

Метотрексат?

1. Через 3 месяца
2. Через 6 месяцев
3. Через 2 года
4. Спустя более 2 лет

Лефлуномид?

1. Через 3 месяца
2. Через 6 месяцев
3. Через 2 года
4. Спустя более двух лет

III Какой препарат Вы обычно принимаете?

1. Метотрексат-Веро
2. Метотрексат-Эбеве
3. Методжект
4. Метотрексат-Валента
5. Другой (какой?)

1. Лефлуномид(арава) Aventis
2. Лефлуномид Канон Россия
3. Лефлайд Россия
4. Элафра Румыния
5. Другой(какой)

IV Какой препарат с Вашей точки зрения предпочтительнее?

1. Метотрексат-Веро
2. Метотрексат-Эбеве
3. Методжект
4. Метотрексат-Валента
5. Другой (какой?)

1. Лефлуномид(арава) Aventis
2. Лефлуномид Канон Россия
3. Лефлайд Россия
4. Элафра Румыния
5. Другой(какой)

V Какую дозу препарата Вам назначили для длительного лечения?

Метотрексат

1. 5 мг в неделю
2. 10 мг в неделю
3. 15 мг в неделю
4. 20 мг в неделю
5. 25 мг в неделю и более

Лефлуномид

1. 20 мг в сутки
2. 10 мг в сутки

VI Как долго Вы принимаете

Метотрексат

1. Менее года
2. От 1 года до 2 лет
3. От 3 до 5 лет
4. От 5 до 10 лет
5. Более 10 лет

Лефлуноמיד

1. Менее года
2. От 1 года до 2 лет
3. от 3 до 5 лет
4. От 5 до 10 лет
5. Более 10 лет

VII Причины отмены

Метотрексата

1. Значительное улучшение
2. Отсутствие эффекта
3. Неблагоприятные реакции (какие?)
4. Другие (какие?)

Лефлуномида

1. Значительное улучшение
2. Отсутствие эффекта
3. Неблагоприятные реакции (какие?)
4. Другие (какие?)

Анализ Ваших ответов позволит улучшить лечение ревматоидного артрита.

murawyu@mail.ru

Лаборатория по изучению безопасности антиревматических препаратов.

Профессор Муравьев Ю.В.

